



ВАЖНО! ПРИВИВКИ!

ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника № 3" настоятельно рекомендует привиться от сезонного гриппа

Грипп - чрезвычайно заразная, тяжелая вирусная инфекция, вызываемая вирусами гриппа и проявляющаяся воспалением дыхательных путей и тяжелой интоксикацией организма.

Типичное заболевание гриппом известно каждому - высокая температура, озноб, сухой кашель, першение или боль в горле, общая слабость, недомогание, боль в суставах и мышцах, одышка. Длительность заболевания составляет 7-14 дней.

Молниеносный грипп - быстрое развитие вирусной пневмонии с отеком легких и остановкой дыхания. Характеризуется быстрым течением (около 3 дней) и высокой вероятностью летального исхода. Применение антибиотиков бесполезно.

Осложнения гриппа многочисленны, разнообразны и возникают, как правило, на 7-й день заболевания. Благодаря своим маленьким размерам, вирус проникает практически во все органы, вызывая их поражение. **Вирусный энцефалит** (воспаление мозга), **миокардит** (воспаление сердечной мышцы), **поражение почек, кишечника, глаз** (конъюнктивит) - вот неполный перечень возможных осложнений.

Другой род осложнений - это **обострение хронических заболеваний**, которые были у пациента до инфекции - сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная недостаточность и др.

Третий вид осложнений - присоединение бактериальной инфекции: **бактериальный конъюнктивит, бактериальная пневмония**.

Единственным эффективным способом профилактики заболевания гриппом является проведенная правильным образом вакцинация. Её следует начинать за 2 недели до подъема заболеваемости (лучше в августе-октябре). Именно столько времени нужно организму на выработку защитных антител.

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» обеспечена вакциной «**СОВИГРИПП®**» для иммунизации детей начиная с 6-ти месячного возраста и подростков, в том числе и в образовательных организациях – школах и детских садах.

В состав вакцины входит **адъювант СОВИДОН™** - **вещество обладающее иммуномодулирующими, детоксицирующими, антиоксидантными и мембранопротекторными свойствами.**

Вакцинация проводится:

- Детям от 6 до 35 месяцев включительно по 0,25 мл (1/2 дозы) вакцины «**СОВИГРИПП®**» двукратно с интервалом 4 недели.
- Детям старше 36 месяцев и взрослым вакцину «**СОВИГРИПП®**» вводят однократно в дозе 0,5 мл.

Противопоказания к применению вакцины «**СОВИГРИПП®**»:

- аллергические реакции на куриный белок или другие компоненты вакцины;
- сильные поствакцинальные реакции или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины гриппозной.
- острые лихорадочные состояния и период обострения хронических заболеваний (временные противопоказания) – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления.

Для получения прививки необходимо обратиться к участковому педиатру или к медицинскому работнику образовательного учреждения, которое посещает Ваш ребёнок